Indice de autores

Año 1978

(Volumen XV)

	Pág.		Pág.
A		González Iturri, J. J Gutiérrez Rincón, J. A	93 153
Alujas, A. J. M	7 37 71	Ī	
В		Ibáñez, E	23 93
Balagué Gea, G.	15 195 233 195 93 209	K Kemper , H. C. G	215
${f c}$		L	
Castelló Roca, A	111 215 203	Liernohn, W	97
Company, X 141.	195	S	
E		Serra-Grima, J. R 89,	223
Estruch Batlle. J	145	${f v}$	
${f G}$		Ventura Farré, J. L Verschuur, E	157 215
Galilea Muñoz. J	209	Vizcaíno, D. F	29

Indice general de materias

Año 1978

(Volumen XV)

	Pág.		Pág
A		\mathbf{G}	
Aprendizaje	7	Gimnasia, luxación	171 23
В			
Balonmano Biomecánica	29 29	H Higiene Humor y deporte	209 103
${f c}$			
Capacidad física 71, Cociente respiratorio 73, Consumo de O ₂ 73, 145, 203, Contraindicaciones deportivas	149 148 216 111	J Juego	11
Corazón atlético	$\begin{array}{c} 89 \\ 223 \end{array}$	L	
E		Limitaciones deportivas Luxación esternal	111 171
Educación física escolar Ejercicio físico, valoración Ejercicio y carbohidratos Energizante	209 223 195 23	M	
Ergo-analizador	146 93 195 151 223	Marcha atlética	233 195 141 15
F		N	
TOUT CO. 1	3.47	7NT 1 A . 1 146	20.

	Pág.		Pág.
P .		S	
Pintura y deporte Pistas polideportivas	45 37	Salas de deporte	37
Predicción de la aptitud física Pruebas de esfuerzo 80,	87 148	T	
Prueba submaximal	203 15 149	Traumatismos renales Transporte de O_2	175 74
		v	
R		Valoración del VO ₂ máx 149, Velódromo	219 165
Radioscopia y deporte Rehabilitación coronaria	153 223	Volumen O2 máx	78
Riñón y accidente deportivo Ritmo motor	175 97	W	
		Waterpolo	115

Medicina Deportiva

Un ejemplo de sinergismo en el tratamiento del dolor

DOGSAPTO[®] Antidoloroso Trisinérgico



Medicina Deportiva

Dolosarto[®] Antidoloroso Trisinérgico

Indicaciones en Medicina Deportiva

- Contusiones
- Algias post-traumáticas
- Tendinitis, dolores reumáticos •

Otras indicaciones

- Estados gripales y/o febriles, cefaleas, resfriado común, etc.
- Odontalgias, otalgias, faringitis, etc.

Dosificación

- Niños (2-6 años) 1/4 tableta × 3 veces al día
- Niños (6-12 años) ½ tableta x 3 veces al día
- Adultos
- 1 tableta × 3 veces al día

Contraindicaciones e incompatibilidades

- Ulcera gastroduodenal; alergia a alguno de sus componentes.
- Puede aumentar la acción de los anticoagulantes orales.

Efectos secundarios. Intoxicación y su tratamiento

- A dosis elevadas, podrían presentarse excepcional-
- mente náuseas o ardor.
 En caso de intoxicación por ingestión de dosis excesivas, se suprimirá la medicación, administrando neutralizantes y bicarbonato.

Presentación y P.V.P.

 Tubo con 16 tabletas efervescentes, 117 ptas.

Composición

Por tableta: 1-bencil--3-(3-dimetilaminopropoxi) -1-indazol clorh. (benzidamina), 50 mg; ácido acetilsalicílico, 500 mg; 7-cloro-1,3-dihidro-3-hidroxi-5 fenil-2H-1,4--benzodiacepin-2-ona (oxacepan), 5 mg; benzosulfimida sódica, 10 mg; excipiente c.s.