

## Sobre un caso de flebotrombosis de esfuerzo en un jugador de baloncesto

Delfin Galiano

Presentamos las imágenes correspondientes a una flebotrombosis de esfuerzo en un jugador de baloncesto de buen nivel deportivo, de 25 años de edad, que durante los ejercicios de calentamiento intentando poner en marcha de forma lenta los compartimentos articulares y sus estructuras, realiza un movimiento de rotación externa y abducción del brazo, forzados por el miembro no afecto.

Nota sensación de tirantez excesiva y dolor intenso en área proximal del miembro afecto. Tras la utilización de spray rubefaciente comienza la competición, que abandona a los 10 minutos al no ceder el dolor. Se mantiene en reposo pensando en una lesión muscular aunque se acompaña de hinchazón de la extremidad y alteración de su movilidad.

Es orientado hacia un especialista en angiología, diagnosticando "Flebotrombosis de esfuerzo" tras anamnesis y estudio complementario angiográfico, que aparece en nuestras dos imágenes.

Las consultas bibliográficas (BALIUS, R. Apunts. Vol. XVII. nº 67) y el análisis del mecanismo lesional nos orientan hacia la siguiente explicación etiológica:

- Estiramiento y pinzamiento de la vena axilar entre clavícula y primera costilla.
- Compresión venosa producida por el pectoral menor, ligamento coracoclavicular o músculo subclavio.

El jugador, de valoración morfológica con predominio mesomórfico, ha estado bajo tratamiento anticoagulante y movilización activa de la extremidad, habiéndose incorporado a sus entrenamientos después de dos meses sin sintomatología.

