

Indice general de materias

Año 1979

(Volumen XVI)

	<i>Pág.</i>		<i>Pág.</i>
A		H	
Alta Montaña	85, 153	Hidrocarbonados y ejercicio	9
Arbitros	183	Hockey	163, 183
B		L	
Balonmano	99	Lípidos y ejercicio	9
C		M	
Condición Física	153	Metabolismo anaeróbico	19
Control médico	153, 191	Metabolismo glucídico	9
Coqueo	85	Metabolismo lipídico	9
D		P	
Deporte escolar	47	Patín a vela	53
E		Política y deporte	157
Endoerino, control del ejercicio	9	Profesorado Educación Física	203
Ejercicio anaeróbico	9	R	
Ejercicio. Cambios metabólicos	9	Ración de espera	91
Entrenamiento - velocidad	105	S	
Equipamentos deportivos	41	Salud y deporte	191
Esfuerzo - Bioquímica	9	Sociología y deporte	95
Evaluación clínica y funcional	191	Supervivencia	131
Excursionismo	109	T	
F		Tobillo	75
Factores limitantes del ejercicio	19	V	
Frío - acción general	137	Valoración esfuerzo	183
Frío - patología	29	Velocidad	105
Fútbol	75	Violencia	99

PERCUTALIN

Antiálgico
y antiinflamatorio
percutáneo

Fórmula por ampolla (no inyectable):

Dexametasona	1 mg.
Salicilamida	170 mg.
Salicilato de etilenglicol	200 mg.
Nicotinato de metilo	10 mg.
Excipiente c.s.p.	2 c.c.

Indicaciones terapéuticas

Esguinces, roturas y contusiones de músculos, tendones y ligamentos. Artritis, artrosis, periartrosis, sinovitis, ciática, dolores cervicales, neuralgias, lumbago, agujetas, etcétera.

En reumatología, traumatología, reeducación funcional. Medicina deportiva y laboral. Antiálgico de aplicación local percutánea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad cutánea a sus componentes.

Incompatibilidades

No aplicar sobre heridas abiertas ni superficies cruentas, zonas de piel herpéticas o eczematosas.

Efectos secundarios

Congestión y prurito locales. Urticaria.

Dosificación

De ataque: 2-4 ampollas (no inyectables) diarias durante un período comprendido entre 2 y 6 días.

Presentación y P.V.P.

Caja con 12 ampollas percutáneas de 2 c.c. autorrompibles. 123'— Ptas.



Dr. J. Martín / Dr. C. Huard - A. Matiasse - (Cinés, 1969, 1, 31, 185)

Sobre más de 200 observaciones, desde el rugby al volley-ball, pasando por el atletismo y la natación.

Repasando una por una las fichas de los tratamientos con Percutalgine (Percutalin), nos hemos dado cuenta, rápidamente, que los resultados obtenidos han sido netamente positivos.



Industrial Farmacéutica de Levante, S.A.

BARCELONA - Mallorca, 216 MADRID - Plaza Isabel II, 5

naprosyn®

el antirreumático de confianza

dos cápsulas dos veces al día



INDICACIONES: Síndromes reumáticos y dolorosos de diversa etiología y localización: Artritis reumatoide, artrosis, osteoartritis, gota, espondilitis anquilosante, polimialgia reumática, etc. Esguinces, luxaciones, fracturas, tendinitis, bursitis, traumatología laboral y deportiva, etc. **DOSIFICACION:** 750-1.000 mg. al día es la dosis de mayor rendimiento. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** Aunque su administración es perfectamente tolerada, en pacientes con historia de procesos gastrointestinales debe ser realizada bajo observación cuidadosa. **CONTRAINDICACIONES:** No existen contraindicaciones absolutas. **INCOMPATIBILIDADES:** No debe administrarse junto a productos como la hidroxycumarina, hidantoina, sulfonamidas prolongadas o salicilatos, si bien en clínica no se han reportado repercusiones por estas circunstancias. **COMPOSICION, PRESENTACION Y P.V.P.:** Frasco con 30 cápsulas conteniendo cada una 250 mg. de Naproxén Syntex, 442 Ptas. Envase con 12 supositorios conteniendo cada uno 500 mg. de Naproxén Syntex, 350 Ptas. **LABORATORIO PREPARADOR:** SYNTEX IBERICA, S.A. Gran Vía Carlos III, 84. Barcelona-28.

 Naprosyn®, con la garantía de la investigación Syntex